

Las Enfermedades Transmitidas Sexualmente (ETS)

Datos Importantes

ETS	¿Cómo se transmite?	Síntomas	Complicaciones	Tratamiento y prevención
Clamidia -causada por una bacteria: <i>chlamydia trachomatis</i>	! Se transmite durante el sexo vaginal, anal u oral con alguien que tiene clamidia	<ul style="list-style-type: none"> Muchas personas no tienen síntomas Si tienen síntomas, aparecen en 1 a 3 semanas <p><u>Mujeres:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Desecho vaginal Ardor o dolor al orinar Sangrado vaginal entre período menstrual Dolor abdominal <p><u>Hombres:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Gotas de líquido blanco o claro que salen por el pene Ardor o dolor al orinar 	<ul style="list-style-type: none"> La enfermedad inflamatoria pélvica puede dañar los órganos reproductivos de la mujer Embarazo fuera de la matriz Esterilidad (no poder tener hijos) Alto riesgo de contraer el VIH, el virus que causa el SIDA Puede pasarse a un bebé durante el parto 	<ul style="list-style-type: none"> Es curable Todas sus parejas sexuales necesitan tratamiento para no volver a infectarse No tener relaciones sexuales hasta que todas las parejas se hayan curado de la infección Los condones son muy efectivos en prevenir la clamidia
Gonorrea -causada por una bacteria: <i>neisseria gonorrhoeae</i>	<ul style="list-style-type: none"> Se transmite durante el sexo vaginal, anal u oral con alguien que tiene gonorrea 	<ul style="list-style-type: none"> Muchas personas no tienen síntomas Cuando hay síntomas, aparecen de 2 a 21 días <p><u>Mujeres:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Desecho vaginal Ardor o dolor al orinar Sangrado vaginal entre período menstrual Dolor abdominal <p><u>Hombres:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Gotas de líquido blanco o claro que salen por el pene Ardor o dolor al orinar 	<ul style="list-style-type: none"> La enfermedad inflamatoria pélvica puede dañar los órganos reproductivos de la mujer Embarazo fuera de la matriz Esterilidad (no poder tener hijos) Alto riesgo de contraer el VIH, el virus que causa el SIDA Puede pasarse a un bebé durante el parto 	<ul style="list-style-type: none"> Es curable Todas sus parejas sexuales necesitan tratamiento para no volver a infectarse No tener relaciones sexuales hasta que todas sus parejas hayan se hayan curado la infección Los condones son muy efectivos en prevenir la gonorrea
Sífilis -causada por una bacteria: <i>treponema pallidum</i>	<ul style="list-style-type: none"> Se transmite durante el sexo vaginal, anal u oral con alguien que tiene sífilis También se puede transmitir por frotación (contacto piel a piel) como durante juegos sexuales 	<p><u>Primera etapa:</u></p> <p>Aparece una o más llagas de color rojizo o café en la boca, los genitales, o dedos que no causan dolor</p> <ul style="list-style-type: none"> Aparacen de 3 a 12 semanas Las llagas duran de 3 a 6 semanas <p><u>Segunda etapa:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Salpullido en el cuerpo, las manos, o los pies; alopecia: caída del pelo en mechones Los síntomas aparecen 6 semanas después de las llagas aparecen Los síntomas pueden aparecer y desaparecer por cerca de un año 	<ul style="list-style-type: none"> Alto riesgo de contraer el VIH Si no recibe tratamiento, puede causar daño al cerebro, enfermedades del corazón, otros problemas de salud, o la muerte Puede causar la muerte o serias complicaciones al feto durante el embarazo. Puede pasarse de la madre al bebé antes de nacer. 	<ul style="list-style-type: none"> Es curable El medicamento no puede ayudar cuando la bacteria de la sífilis ya causó daños (por ejemplo, al corazón etc.) Todas sus parejas sexuales necesitan tratamiento para prevenir reinfectarse. No tener relaciones sexuales hasta que todas sus parejas se hayan curado la infección Los condones no cubren todas las áreas infectadas, por eso solo dan mínima protección

<p>Tricomonas -causada por un protozoario: <i>trichomonas vaginalis</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Se transmite por el sexo vaginal con alguien que tiene Tricomonas ● Se puede transmitir por contacto con objetos contaminados con fluidos vaginales. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Muchas mujeres y la mayoría de los hombres no presentan síntomas ● Si tienen síntomas, aparecen en 2 a 28 días <p><u>Mujeres:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Desecho blanco o verdoso, espumoso y oloroso ● Comezón ● Dolor al orinar <p><u>Hombres:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Comezón ● Dolor al orinar ● Desecho transparente del pene 	<ul style="list-style-type: none"> ● Alto riesgo de contraer VIH ● Puede causar complicaciones durante el embarazo 	<ul style="list-style-type: none"> ● Se puede curar con medicina ● Todas sus parejas sexuales necesitan tratamiento para no volver a infectarse ● No tener relaciones sexuales hasta que todas sus parejas se hayan curado la infección ● Los condones son muy efectivos en prevenir las tricomonas
<p>Herpes -causado por un virus: <i>herpes del virus simple</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Se transmite durante el sexo vaginal, anal u oral con alguien que tiene herpes ● También se puede transmitir por frotación (contacto piel a piel) como durante juegos sexuales ● Se puede transmitir aunque no haya ampollas presentes 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pequeñas ampollas rojas y dolorosas cerca o dentro de los genitales, recto, o en la boca ● Fiebre y dolor de cabeza ● Pueden aparecer 2 a 20 días después de contacto sexual ● Pueden durar de 2 a 3 semanas, y pueden reaparecer durante el resto de la vida 	<ul style="list-style-type: none"> ● Los brotes pueden ser dolorosos ● Alto riesgo de VIH ● Puede pasarse a un bebé durante el parto 	<ul style="list-style-type: none"> ● No hay cura ● Hay medicamento para aliviar el dolor y reducir la duración de las ampollas ● Los condones no cubren todas las áreas infectadas, por eso solo dan mínima protección
<p>Verrugas Genitales -causada por un virus: <i>papiloma humano</i> (VPH)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Se transmite durante el sexo vaginal o anal con alguien que tiene VPH ● También se puede transmitir por frotación (contacto piel a piel) como durante juegos sexuales ● Se puede transmitir aunque no haya verrugas presentes ● El virus permanece en el cuerpo por el resto de su vida 	<ul style="list-style-type: none"> ● Las verrugas pueden ser planas o redondas, una o muchas cerca o dentro de los genitales ● Muchas personas no tienen verrugas visibles ● Los síntomas pueden aparecer 1 a 8 meses o más después del contacto sexual 	<ul style="list-style-type: none"> ● Alto riesgo de cáncer del cerviz en las mujeres ● Alto riesgo de algunos tipos de cáncer en los hombres, pero es raro 	<ul style="list-style-type: none"> ● No hay cura ● Se pueden quitar por medicamento o cirugía, pero pueden reaparecer ● Los condones no cubren todas las áreas infectadas, por eso solo dan mínima protección
<p>Hepatitis B -causada por un virus: <i>hepatitis B</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ! Se transmite durante el sexo vaginal, anal u oral con alguien que tiene Hepatitis B ! Compartiendo agujas o utensilios para drogas, tatuajes, o agujeros en el cuerpo ! Compartiendo cepillos de dientes u hojas de afeitar 	<ul style="list-style-type: none"> ● Muchas personas no tienen síntomas ● Algunos pueden tener: <ul style="list-style-type: none"> ● Cansancio ● Ojos o piel amarilla (Ictericia) ● Náuseas ● Malestar abdominal ● Orina oscura o excremento claro 	<ul style="list-style-type: none"> ● Daños del Hígado ● Cáncer del Hígado ● Deficiencia del Hígado 	<ul style="list-style-type: none"> ● No hay cura ● La mayoría de adultos se recupera de 1 a 2 meses ● Los que no se recuperan puede transmitir la Hepatitis por el resto de su vida ● Una vacuna está disponible para prevenir la Hepatitis B ● Los condones son muy efectivos en prevenir la Hepatitis B